

Лейкоз крупного рогатого скота

Лейкоз - хронически протекающая неизлечимая инфекционная болезнь крупного рогатого скота. От заражения до появления симптомов проходит от 2 месяцев до 6 лет.

Стадии заболевания:

<u>Бессимптомная</u> - в крови появляются антитела к возбудителю лейкоза (симптомов нет) - инфицированные животные;	<u>Гематологическая</u> изменения крови - увеличение числа лимфоцитов (симптомов нет) - больные животные;	<u>Клиническая:</u> увеличение лимфатических узлов; появление опухолевых образований в различных частях тела; нарушение половых циклов, гипотония преджелудков, отеки, пучеглазие, снижение молокоотдачи, исхудание, выпадение шерсти на голове и холке- больные животные.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Источником болезни являются и больные и инфицированные животные.

Пути передачи: кровь, молоко, секреты и экскреты больных и инфицированных животных, а также другие объекты внешней среды, обсемененные возбудителем.

Заражение происходит при совместном содержании, выпасе, доении здоровых животных (без вируса лейкоза) с больными и инфицированными.

Вакцинации и лечения не существует!

Больных животных необходимо изолировать и направить на убой в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза.

Молоко и молозиво, полученные от **больных** коров, уничтожается.

Инфицированных животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения антител к возбудителю необходимо отделить от здоровых и вывезти в резервацию.

Молоко, полученное от **инфицированных** коров, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия (молозиво подвергается такой же термической обработке и используется внутри резервации).

Молоко, полученное от здоровых коров (без вируса лейкоза), реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.

Убой **больных** и **инфицированных** животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах.

Для оздоровления Вашего хозяйства необходимо провести все мероприятия, направленные на ликвидацию очага лейкоза крупного рогатого скота